


Colelitiasis Tratamiento

La colecistectomía es el procedimiento quirúrgico indicado para el tratamiento de colelitiasis - colecistítis.

Según riesgo o complicaciones posibles, se elige entre dos técnicas, laparoscópica o abierta.

Colecistectomía: Laparoscópica



- 93% de procedimientos, son laparoscópicas. Dura de 1 a 2 horas.

- Para este procedimiento se abrirán 4 incisiones pequeñas de < 10 mm.

- Por estas incisiones se extirpará la vesícula biliar.

- Utilizando pinzas y cámara de video apropiadas para laparoscopia.

- Recuperación rápida y con poco dolor.

- <3% de los procedimientos, indicado para pacientes de riesgo. Dura más de dos horas.

- Para extirpar la vesícula se realizará una incisión de 13 cm en el lado superior derecho del abdomen.

- Recuperación lenta, dolor moderado.

Colecistectomía: Técnica abierta



- 20% de los pacientes con síntomas no se someten a cirugía.

- La sintomatología (episodios) pudiera regresar dentro de 12 semanas.

- Para evitar nuevos episodios debe aumentar ejercicio de 2 a 3 horas a la semana.

Prefiera frutas y verduras, evite alimentos con exceso de carbohidratos (golosinas, pasteles o pan blanco).

Tratamiento No quirúrgico



Dr. Fernando Torres Jaramillo
FACS

Cirugía General y laparoscópica
Cirugía Bariátrica (Obesidad) -
Metabólica

+593 (9) 9 930 5350

+593 (2) 3 514301



Hospital de los Valles.
Consultorio 240
Cumbayá - Ecuador

info@cirujano.ec

colelitiasis

Escanea
Código
Qr

www.cirujano.ec

